

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 456 152 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91107307.0

(51) Int. Cl.⁵: **C07K 7/06, G01N 33/86,
A61K 37/02**

(22) Anmeldetag: 06.05.91

(30) Priorität: 08.05.90 DE 4014655

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.11.91 Patentblatt 91/46

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: **BEHRINGWERKE
Aktiengesellschaft
Postfach 1140
W-3550 Marburg 1(DE)**

(72) Erfinder: **Stüber, Werner, Dr.
Cölber Weg 12
W-3551 Lahntal(DE)
Erfinder: Fickenschner, Karl, Dr.
Sonnenweg 8
W-3550 Marburg(DE)**

(74) Vertreter: **Klein, Otto, Dr. et al
Hoechst AG Zentrale Patentabteilung
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)**

(54) **Peptidamide, Verfahren zu deren Herstellung und diese enthaltende Mittel als
Fibrin/Thrombin-Gerinnungsinhibitoren.**

(57) Es werden Peptidamide der allgemeinen Formel I

GPRP-X-NR₁R₂ I

wobei G die Aminosäure Glycin, P die Aminosäure L-Prolin, R die Aminosäure L-Arginin, X eine proteinogene Aminosäure außer Prolin oder ein Dipeptid aus diesen Aminosäuren einschließlich Prolin, N Stickstoff und R₁ und R₂ gleich oder verschieden und Wasserstoff oder eine niedere Alkylkette mit bis zu 4-Kohlenstoffatomen bedeuten; Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung als Arzneimittel oder für diagnostische Zwecke beschrieben.

EP 0 456 152 A2

Die Erfindung betrifft Oligopeptidamide sowie Verfahren zu deren Herstellung. Die beschriebenen Verbindungen sind im Stande, die Clotbildung im Blut, d. h. die Blutgerinnung, zu verhindern. Dadurch sind diese Peptide therapeutisch und diagnostisch von Interesse.

Nach dem Stand des Wissens sind Verbindungen bekannt, die in der Lage sind, die Blutgerinnung zu inhibieren. Solche Substanzen sind unter anderem Peptidderivate und Proteine. Hierzu zählen insbesondere das therapeutisch eingesetzte Antithrombin III und die diagnostisch eingesetzten Peptidchormethylketone. Die Wirksamkeit dieser Substanzen liegt in der Inhibition von Thrombin, das bedeutet, Fibrinogen wird nicht mehr zu Fibrin abgebaut und F XIII wird nicht aktiviert.

Für diverse diagnostische Zwecke ist es allerdings von Interesse, die Blutgerinnungskaskade unter Bildung von Thrombin voll zu aktivieren, oder direkt Thrombin zum Testansatz zuzusetzen, ohne jedoch ein Gerinnsel entstehen zu lassen. Das bedeutet, es müssen Gerinnungsinhibitoren eingesetzt werden, die in der Lage sind, bereits durch Thrombin gebildetes Fibrin an der Ausbildung eines Gerinnsels zu hindern.

Für therapeutische Zwecke ist es von Interesse, die Ausbildung eines Fibringerinnsels bei Vorhandensein von löslichem Fibrin zu unterbinden. Hierzu zählen z. B. die Verhinderung der Okklusion der Arteriolen bei einer disseminierten intravasalen Gerinnung oder die Unterbindung einer Neuausbildung eines Fibringerinnsels bei einer Lysetherapie unter Fortbestehen der lokalen Gerinnungsaktivierung.

Wie in der Patentschrift DE 38 11 647 gezeigt wurde, kann durch Zusatz eines Gerinnungsinhibitors ein Testsystem für den Blutgerinnungsfaktor XIII aufgebaut werden. Der zugesetzte Clotinhibitor inhibiert nicht das Thrombin, sondern verhindert die Zusammenlagerung von löslichen Fibrinketten. Das verwendete Peptid hat die Peptidsequenz Gly-Pro-Arg-Pro. Allerdings ist von Nachteil, daß von diesem Peptid eine verhältnismäßig große Menge zur vollständigen Gerinnselvermeidung zugesetzt werden muß. Dasselbe trifft auch auf den therapeutischen Einsatz dieses Tetrapeptids zu.

Auf dem XI. Amerikanischen Peptidsymposium (July 1989) wurde eine Reihe weiterer wirksamer Peptidderivate präsentiert (Abkürzungen sind später erläutert):

Struktur

relative Wirksamkeit

(Menge an Plasma, die mit definierter Inhibitormenge inhibiert wird)

GPRP	1
GPRP-4-hydroxypiperidid	1.2
GPRP-3-methylpiperidid	1.29
GPRP-NH ₂	3.52
GPRPP-NH ₂	4.56

Die Wirkungssteigerung der gezeigten Peptide beruht auf dem Einbau von cyclischen Aminderivaten als C-terminalem Baustein.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, gegenüber dem Stand der Technik noch wirksamere Peptide zu finden.

Gegenstand der Erfindung sind deshalb Peptidamide der allgemeinen Formel I



wobei G die Aminosäure Glycin, P die Aminosäure L-Prolin, R die Aminosäure L-Arginin, X eine proteinogene Aminosäure außer Prolin oder ein Dipeptid aus diesen Aminosäuren einschließlich Prolin, N Stickstoff und R₁ und R₂ gleich oder verschieden und Wasserstoff oder eine niedere Alkylkette mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeuten.

Beispielhaft werden die folgenden Peptide genannt:

GPRPA-NH₂, GPRPS-NH₂, GPRPK-NH₂, GPRPF-NH₂, GPRPG-NH₂, GPRPW-NH₂, GPRPY-NH₂, GPRPV-NH₂, GPRPI-NH₂, GPRPD-NH₂, GPRPE-NH₂, GPRPG-NH(Ethyl), GPRPG-N(Ethyl)₂, GPRPS-NH

(Isopropyl), GPRPW-N(Methyl)₂, GPRPG-NH(Butyl), GPRPP-NH₂, GPRPGG-NH₂, GPRPPR-NH₂, GPRPRP-NH₂, GPRPPP-NH(Isopropyl), GPRPAG-NH₂ und GPRPGG-NH₂.

Die Aminosäuren, deren Stereoform oben nicht definiert wurde, liegen vorzugsweise in der L-Form vor, können jedoch auch in der D-Form vorliegen.

- 5 Die Herstellung der erfindungsgemäßen Peptidderivate erfolgt nach an sich bekannter Methoden, wobei für die Synthese der nichtalkylierten Amide (R1 und R2 gleich Wasserstoff) die Solid-Phase-Methode eingesetzt wurde. Vorzugsweise wurde dabei vorgegangen wie in Int. J. Peptide Protein Res. 34, 215-221, 1989 beschrieben.

10 Die Peptide wurden bevorzugt an 1% quervernetztem Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer, das mit einer säurelabilen Amidankerfunktion derivatisiert war, aufgebaut. Die anfängliche Aminogruppenbildung lag in dem Bereich von 0.3-0.8 mmol/g Harz.

Die Synthese wurde unter repetitiver Kopplung der einzelnen geschützten Aminosäuren vom C- zum N-Terminus des Peptids ausgeführt. Entsprechend ihrer chemischen Struktur sind die Aminosäuren am N-alpha-Stickstoff und gegebenenfalls an der Drittfunktion geschützt. Die Stickstofffunktionen (N-alpha) waren 15 mit der Fmoc-Gruppe, alkoholische Seitengruppen als tert.-Butylether-, Carboxylgruppen in der Seitenkette als tert.-Butylester und die Guanidingruppe mit der Mtr oder Pmc-Gruppe geschützt.

Der Aufbau der Peptide erfolgte dabei unter Einbezug der folgenden Schritte an einem halb- oder vollautomatischen Peptidsynthesizer:

- Harz waschen (15 ml/g Harz) Lösemittel DMF (oder Dichlormethan oder N-Methylpyrrolidon)
- 20 - Abspaltung der Fmoc-Gruppe mit 20% Piperidin in DMF
- Waschen des Harzes mit DMF (oder N-Methylpyrrolidon)
- Ankopplung der Aminosäure durch Einsatz eines Kondensationsmittels wie Carbodiimid, gegebenenfalls unter Zusatz von HOBt oder statt dessen Einsatz eines gemischten oder symmetrischen Anhydrids oder eines Aktivesters.
- 25 - nach vollendeter Kopplung Auswaschung der überschüssigen Reagentien (DMF).

Als letzte Aminosäure wurde üblicherweise eine Boc-Aminosäure eingesetzt.

Das Peptid wurde dann mit einer Mischung aus Trifluoressigsäure, vorzugsweise 90%, und in Gegenwart eines Scavengers, wie Ethandithiol, Wasser, Resorcin, Anisol oder Thioanisol, einzeln oder als Scavenger-mischung während 1-2 Stunden bei Raumtemperatur oder bei Temperaturen bis 40 Grad abgespalten.

30 Die Peptide wurden durch Präzipitation in einem Ether kristallisiert und durch Gelpermeation gereinigt. Die Reinheit der Peptide wurde durch HPLC und Aminosäureanalyse festgestellt.

Die Synthese der Penta- und Hexapeptidalkylamide wurde nach der klassischen, in Lösung arbeitenden Methode ausgeführt.

35 Zuerst wurde die geschützte (Boc- oder Z-) Aminosäure an das entsprechende Alkylamin gekoppelt, wobei dieselben Methoden wie bei der Solid-Phase-Methode verwendet wurden. Die Zwischenprodukte wurden, je nach physikalischem Verhalten, durch Umkristallisieren, Ausschütteln und Umfällen aufgereinigt. Nach Abspaltung der N-terminalen Schutzgruppe, im Falle von Boc durch Acidolyse mit 1,2N HCl in Eisessig oder mit 50% TFA in Dichlormethan, im Falle von Z durch Hydrogenolyse, wurde die nächste Aminosäure wie bereits beschrieben angekoppelt. Bei Arginin wurde üblicherweise auf eine Schutzgruppe an der 40 Guanidinogruppe verzichtet, diese war lediglich protoniert.

Nach finaler Entschützung wurden die Peptide wie üblich gereinigt. Dazu kamen als Methode die Gelpermeation und ausnahmsweise auch eine HPLC-Reinigung an RP-18 Material in Frage. Die Verbindungen wurden mit HPLC und Aminosäureanalyse und ¹³C-NMR-Spektroskopie auf Homogenität und Struktur untersucht.

45 Die erfindungsgemäßen Peptide wurden auch auf ihre Inhibitionsfähigkeit getestet. Hierzu wurde eine Plasmaprobe mit Inhibitor versetzt und nach Zugabe von Thrombin die Zeit bestimmt, bis die Probe geronnen war. Ein repräsentatives Ergebnis ist unter den Beispielen aufgeführt.

Wie man daraus erkennt, haben die erfindungsgemäßen Peptide gegenüber den bekannten Verbindungen deutlich erhöhte Inhibitionspotentiale.

50 Im Falle der Pentapeptidamide wurde dabei überraschenderweise gefunden, daß als C-terminale Aminosäure besonders kleine Aminosäuren wie Glycin und Alanin günstig sind. Nach dem Stand der Technik werden hier jedoch cyclische Strukturen wie Prolin oder Piperidinderivate bevorzugt.

Abkürzungen:

55

Ala = A	Alanin
Asp = D	Asparaginsäure
Asn = N	Asparagin

Gly = G	Glycin
Val = V	Valin
Leu = L	Leucin
Ile = I	Isoleucin
5 Ser = S	Serin
Thr = T	Threonin
Met = M	Methionin
Pro = P	Prolin
Lys = K	Lysin
10 Arg = R	Arginin
Glu = E	Glutaminsäure
Gln = Q	Glutamin
Phe = F	Phenylalanin
Tyr = Y	Tyrosin
15 Trp = W	Tryptophan
HOBt	Hydroxybenzotriazol
DIC	Diisopropylcarbodiimid
TFA	Trifluoressigsäure
Z	Benzyloxycarbonyl
20 Boc	Butyloxycarbonyl
Fmoc	Fluorenylmethyloxycarbonyl
Pmc	Pentamethylchromansulfonyl
DMF	Dimethylformamid

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Erfindung näher:

Beispiel:

Herstellung von Gly-Pro-Arg-Pro-Ala-NH₂

30 1 g Fmoc-Amidanker-Resin (0.47 mmol Aminogruppen/Gramm) wurde 3 mal mit 15 ml DMF gewaschen und die Fmoc-Gruppe mit 20 % Piperidin in DMF (1 x 3 min; 1 x 10 min) abgespalten. Das Harz wurde je 2 mal mit DMF und Isopropanol gewaschen. Daraufhin wurden 2 mmol Fmoc-Ala mit 3 mmol HOBt und 2.2 mmol DIC in 15 ml DMF mit dem Harz eine Stunde lang inkubiert. Überschüssige Reagentien wurden dann abfiltriert und das Harz je 2 mal mit DMF und Isopropanol gewaschen. Die Vollständigkeit der Umsetzung
35 wurde mit einem Ninhydrintest geprüft und bei eventueller Unvollständigkeit wurde die Kopplung wiederholt. Nach dieser Methode wurden auch die anderen Aminosäuren angekoppelt. Bei Arg wurde die Pmc-Schutzgruppe eingesetzt. Als letzte Aminosäure wurde eine Boc-Aminosäure benutzt. Das Peptidharz wurde mit Methanol und Diethylether gewaschen und im Vakuum getrocknet. Das Harz wurde mit 20 ml einer Mischung aus 90 % TFA und 10 % Ethandithiol 1 Stunde bei 35 °C behandelt. Das gelöste Peptid wurde in
40 Ether kristallisiert und an ⁸Sephadex-G25 in 0.5 % Essigsäure chromatographiert. Der Peptidpool wurde gefriergetrocknet und war laut HPLC zu 95 % rein. Die Aminosäureanalyse zeigte einen Peptidgehalt von 68 %.

Austestung:

45 Zu 25 Mikroliter Plasma wurden 100 Mikroliter des Gerinnungsinhibitor (Peptid) unterschiedlicher Konzentration gegeben. Die Umwandlung des Fibrinogens in Fibrin wurde durch Zugabe von 25 Mikroliter Thrombin (50 IU/ml) ausgelöst. Die Gerinnung des Ansatzes wurde durch Messung der Trübung auf einem Gerinnungsanalysator (ACL 300 mit angeschlossenen Rechner) verfolgt.

50 In einem zweiten Ansatz wurden zu 100 Mikroliter Plasma jeweils 50 Mikroliter der Peptidlösung und 50 Mikroliter Thrombinlösung zugegeben und wie oben gemessen. Als Eintritt der Gerinnung wurde der Zeitpunkt angesehen, bei dem das Streulicht um den gleichen Betrag angestiegen war, wie es vom Hersteller des Gerätes (Instrumentation Laboratory, Mailand) für die Bestimmung der Prothrombinzeit bei Plasmaproben vorgesehen ist.

55 Alle angegebenen Peptide sind Peptidamide (R₁ = R₂ = H). Die angegebenen Werte sind Gerinnungszeiten in Sekunden.

Testansatz I: 100 µl Clotinh inhibitor
 25 µl Plasma
 25 µl Thrombin

Gerinnungszeiten in Sekunden

Konzentration des
 Clotinh inhibitors

mg/ml 2 1 0,5 0,25 0,125 0,06

Peptidamid

GPRPPP	592,2	498,1	201,7	76,3	28,8	21,2
GPRPG	999,9	718,5	229,3	73,5	27,9	20,3
GPRPPR	493,4	310,9	109,6	66,8	30,7	21,2
GPRPRP	574,1	617,8	205,5	79,2	32,6	21,2
GPRPA	635,9	535,0	300,5	148,5	51,6	24,1
GPRPD	430,7	166,6	45,9	22,2	20,3	21,2
GPRPW	879,1	726,1	190,3	70,6	26,9	20,3
GPRPK	258,1	139,9	173,2	102,0	51,6	25,0
GPRPS	115,3	114,3	83,3	41,2	23,1	20,3
GPRP	494,3	181,8	48,8	23,1	20,3	20,3
GPRPP	699,5	425,9	228,3	73,5	28,8	
GPRPV	174,2	225,5	148,5	83,0	32,6	
GPRPI	785,0	968,4	181,8	57,3	25,9	
GPRPF	482,9	196,0	88,7	33,6	21,2	
GPRPAG	201,7	191,3	142,8	84,9	33,6	
GLRPG	25,0	25,0	25,0	24,1	24,1	

Testansatz II: 50 µl Clotinh inhibitor

100 µl Plasma

50 µl Thrombin

Gerinnungszeiten in Sekunden

Konzentration des
Clotinh inhibitors

mg/ml 2 1 0,5 0,25 0,125 0,06

----- Peptidamid

GPRPPP	316,7	61,1	-	19,3	19,3	20,3
GPRPG	126,7	43,1	20,3	18,4	19,3	19,3
GPRPPR	89,6	32,6	19,3	18,4	19,3	19,3
GPRPRP	106,7	36,4	19,3	18,4	19,3	19,3
GPRPA	448,7	83,9	25,9	19,3	19,3	19,3
GPRPD	350,9	48,8	47,8	19,3	20,3	20,3
GPRPW	85,8	25,0	19,3	19,3	19,3	20,3
GPRPK	113,4	35,5	19,3	18,4	19,3	19,3
GPRPS	77,3	25,0	18,4	18,4	19,3	20,3
GPRP	31,7	19,3	19,3	19,3	20,3	20,3
GPRPP	239,7	60,2	21,2	18,4	19,3	19,3
GPRPV	168,4	43,1	20,3	18,4	19,3	
GPRPI	93,4	27,9	19,3	18,4	20,3	
GPRPF	47,8	20,3	18,4	19,3	19,3	
GPRPAG	195,1	49,7	20,3	18,4	19,3	
GLRPG	21,2	21,2	21,2	20,3	21,2	

Testansatz III: 20 µl Clotinh inhibitor mit Thrombin
130 µl Plasma

Gerinnungszeit in Sekunden

Konzentration des
Clotinh inhibitors

mg/ml 10 5 2,5 1,25 0,625

Peptidamid

GPRPPP	43,1	85,8	35,5	20,3	18,4
GPRPG	656,8	104,8	40,2	19,3	18,4
GPRPPR	209,3	70,6	28,8	19,3	18,4
GPRPRP	323,3	77,3	28,8	18,4	18,4
GPRPA	999,9	272,9	76,3	25,0	18,4
GPRPD	101,0	24,1	18,4	18,4	17,4
GPRPW	155,2	38,3	19,3	18,4	18,4
GPRPK	575,1	114,3	41,2	20,3	18,4
GPRP	926,6	86,7	22,2	18,4	18,4
GPRPP	327,7	97,2	37,3	20,3	18,4
GPRPV	69,7	109,6	43,1	20,3	18,4
GPRPI	448,7	107,7	32,6	19,3	18,4
GPRPF	261,6	59,2	20,3	18,4	18,4
GPRPAG	22,2	71,6	45,0	20,3	18,4
GLRPG	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4

Patentansprüche

1. Peptidamide der allgemeinen Formel I

GPRP-X-NR₁R₂ I

wobei G die Aminosäure Glycin, P die Aminosäure L-Prolin, R die Aminosäure L-Arginin, X eine proteinogene Aminosäure außer Prolin oder ein Dipeptid aus diesen Aminosäuren einschließlich Prolin, N Stickstoff und R₁ und R₂ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff oder eine niedere Alkylkette mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeuten.

2. Peptidamide nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß X eine Aminosäure ausgewählt aus der Gruppe Gly oder Ala ist und R₁ und R₂ Wasserstoff sind.
3. Peptidamide nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Aminosäuren in der L-Form vorliegen.
4. Peptidamide nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Aminosäuren in der L-Form vorliegen.

5. Peptidamid GPRPA-NH₂, GPRPS-NH₂, GPRPK-NH₂, GPRPF-NH₂, GPRPG-NH₂, GPRPW-NH₂, GPRPY-NH₂, GPRPV-NH₂, GPRPI-NH₂, GPRPD-NH₂, GPRPE-NH₂, GPRPG-NH(Ethyl), GPRPG-N(Ethyl)₂, GPRPS-NH(Isopropyl), GPRPW-N(Methyl)₂, GPRPG-NH(Butyl), GPRPPP-NH₂, GPRPGG-NH₂, GPRPPR-NH₂, GPRPRP-NH₂, GPRPPP-NH(Isopropyl), GPRPAG-NH₂ oder GPRPGG-NH₂.

6. Verfahren zur Herstellung eines Peptidamids nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß geschützte Aminosäuren, Aminosäurederivate oder Peptidsegmente in Lösung oder an einer Festphase aneinander gekoppelt werden und durch Abspaltung der Schutzgruppen sowie im Falle einer Festphase durch Abspaltung vom Trägerharz Peptide gemäß Struktur (I) erhalten werden.

7. Peptidamid nach Anspruch 1 zur Verwendung als Arzneimittel.

8. Verwendung eines Peptids nach Anspruch 1 für diagnostische Zwecke oder als Diagnostikum.

15 Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten: ES, GR

1. Verfahren zur Herstellung eines Peptidamids der allgemeinen Formel I



wobei G die Aminosäure Glycin, P die Aminosäure L-Prolin, R die Aminosäure L-Arginin, X eine proteinogene Aminosäure außer Prolin oder ein Dipeptid aus diesen Aminosäuren einschließlich Prolin, N Stickstoff und R₁ und R₂ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff oder eine niedere Alkylkette mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeuten, dadurch gekennzeichnet, daß geschützte Aminosäuren, Aminosäurederivate oder Peptidsegmente in Lösung oder an einer Festphase aneinander gekoppelt werden und durch Abspaltung der Schutzgruppen sowie im Falle einer Festphase durch Abspaltung vom Trägerharz Peptide gemäß Struktur I erhalten werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1; dadurch gekennzeichnet, daß X eine Aminosäure ausgewählt aus der Gruppe Gly oder Ala und R₁ und R₂ Wasserstoff sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Aminosäuren in der L-Form vorliegen.

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Aminosäuren in der L-Form vorliegen.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß GPRPA-NH₂, GPRPS-NH₂, GPRPK-NH₂, GPRPF-NH₂, GPRPG-NH₂, GPRPW-NH₂, GPRPY-NH₂, GPRPV-NH₂, GPRPI-NH₂, GPRPD-NH₂, GPRPE-NH₂, GPRPG-NH(Ethyl), GPRPG-N(Ethyl)₂, GPRPS-NH(Isopropyl), GPRPW-N(Methyl)₂, GPRPG-NH(Butyl), GPRPPP-NH₂, GPRPGG-NH₂, GPRPPR-NH₂, GPRPRP-NH₂, GPRPPP-NH(Isopropyl), GPRPAG-NH₂ oder GPRPGG-NH₂ hergestellt werden.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 456 152 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91107307.0

(51) Int. Cl. 5: **C07K 7/06, G01N 33/86,
A61K 37/02**

(22) Anmeldetag: 06.05.91

(30) Priorität: 08.05.90 DE 4014655

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.11.91 Patentblatt 91/46

(94) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(96) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 22.07.92 Patentblatt 92/30

(71) Anmelder: **BEHRINGWERKE
Aktiengesellschaft
Postfach 1140
W-3550 Marburg 1(DE)**

(72) Erfinder: **Stüber, Werner, Dr.
Cölber Weg 12
W-3551 Lahntal(DE)
Erfinder: Fickenscher, Karl, Dr.
Sonnenweg 8
W-3550 Marburg(DE)**

(74) Vertreter: **Fischer, Hans-Jürgen, Dr. et al
Hoechst AG Zentrale Patentabteilung
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)**

(54) **Peptidamide, Verfahren zu deren Herstellung und diese enthaltende Mittel als
Fibrin/Thrombin-Gerinnungsinhibitoren.**

(57) Es werden Peptidamide der allgemeinen Formel

GPRP-X-NR₁R₂

wobei G die Aminosäure Glycin, P die Aminosäure L-Prolin, R die Aminosäure L-Arginin, X eine proteinogene Aminosäure außer Prolin oder ein Dipeptid aus diesen Aminosäuren einschließlich Prolin, N Stickstoff und R₁ und R₂ gleich oder verschieden und Wasserstoff oder eine niedere Alkylkette mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeuten; Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung als Arzneimittel oder für diagnostische Zwecke beschrieben.

EP 0 456 152 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 10 7307

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL5)
A	JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. Bnd. 24, Nr. 3, 1. März 1981, WASHINGTON US Seiten 322 - 327; KH HSIEH ET AL.: 'fibrin polymerization. 1. alkylating peptide inhibitors of fibrin polymerization' * Tabelle 1,2 * ---	1-8	C 07 K 7/06 G 01 N 33/86 A 61 K 37/02
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Bnd. 113, Nr. 19, 5. November 1990, Columbus, Ohio, US; Zusammenfassung 172426M, K KAWASAKI ET AL.: 'proparation of antithrombotic proline-containing peptideamides' Seite 744, Spalte L; * Zusammenfassung * & JP-A-02 115 197 (DAIICHI SEIYAKU CO LTD) 27. April 1990 ---	1-8	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, Bnd. 107, Nr. 23, 7. Dezember 1987, Columbus, Ohio, US; Zusammenfassung 215362H, N G LEVITSKAYA ET AL.: 'the influence of low molecular weight synthetic peptides on fibrin formation' Seite 389, Spalte R; * Zusammenfassung * & BYULL. EKSP. BIOL. MED. Bnd. 104, Nr. 8, 1987, Seiten 190 - 192 ---	1-8	
P;X	CHEMICAL ABSTRACTS, Bnd. 115, Nr. 11, 16. September 1991, Columbus Ohio, US; Zusammenfassung 1090148, K FICKENSCHER ET AL.: 'a photometric assay or blood coagulation factor XIII' Seite 371, Spalte L; * Zusammenfassung * & THROMB. HAEMOSTASIS Bnd. 65, Nr. 5, 1. Mai 1991, Seiten 535 - 540 -----	1-8	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 03-03-1992	Prüfer MASTURZO P.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	